

INDICACIONES PARA EL MANEJO DE ANIMALES AFECTADOS DE ESPOROTRICOSIS

CARTILLA INFORMATIVA

La esporotricosis es una micosis de presentación subcutánea con posibilidades de generalización de evolución subaguda o crónica, que se adquiere típicamente por inoculación traumática de materiales del suelo y plantas contaminadas. El ambiente y los gatos enfermos o portadores constituyen fuentes de infección por medio de los arañazos o por sus mordidas.

¿Cómo se confirma la infección en un animal sospechoso?

Mediante pruebas de laboratorio y aislamiento micológico de las lesiones.

¿Qué debe hacer el propietario?

- Brindarle asistencia médico veterinaria. El profesional evaluará el estado clínico del paciente a fin de ofrecer el tratamiento más adecuado.
- Evitar que los mismos tengan hábitos vagabundeo y acceso al peri-domicilio.
- Realizar higiene periódica de las viviendas, mediante recolección regular de residuos y limpieza de superficies con hipoclorito de sodio manteniendo un tiempo de contacto mínimo del producto durante 10 minutos.

¿Qué se hace con un animal enfermo?

Se recomienda la castración y tratamiento del gato con diagnóstico confirmado. En los casos de convivir con un animal diagnosticado o sospechoso de esporotricosis se debe concurrir al médico del centro de salud más cercano para que determine qué pasos seguir en relación a las personas expuestas.